

VIOZOIS S.A.

VIOLAMB

**ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60%:** Υψηλής ποιότητας γάλα για τον απογαλακτισμό των νεαρών αμνοεριφίων. Με περιεκτικότητα σε σκόνη αποβουτηρωμένου γάλακτος σε ποσοστό 60% και συνολικά γαλακτικά προϊόντα σε ποσοστό 78%, αποτελεί κορυφαία κατηγορία γάλακτος και την επιλογή για το σωστότερο απογαλακτισμό των νεαρών ζώων.

**ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 50%:** Υψηλής ποιότητας γάλα για τον απογαλακτισμό των νεαρών αμνοεριφίων. Με περιεκτικότητα σε σκόνη αποβουτηρωμένου γάλακτος σε ποσοστό 50%, συνολικά γαλακτικά προϊόντα σε ποσοστό 78% και μια πλούσια σύνθεση σε βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία, αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας γάλα που συνδιάζει την ιδανική σχέση ποιότητας - τιμής και το καθιστά άριστη επιλογή για τον απογαλακτισμό των ζώων.

**MILK POWDER 60%:** High quality milk for weaning of young lambs. With skim milk powder content of 60% and total lactic products at a rate of 78%, it is top class milk powder and the right choice for the best weaning of young animals.

**MILK POWDER 50%:** High quality milk for weaning of young lambs. With skim milk powder content of 60% and total lactic products at a rate of 78%, and a composition rich in vitamins and minerals, it is a high quality powder milk that combines the ideal quality/price ratio, making it an excellent choice for animal weaning.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (FEEDING TABLE)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΖΩΗΣ (WEEK OF LIFE)	ΡΟΦΗΜΑ (λίτρα) (DRINK (lt))	ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (DAILY DOSAGE)
1 <sup>η</sup> -2 <sup>η</sup> ημέρα (1 <sup>st</sup> -2 <sup>nd</sup> day)	Μητρικό γάλα (Breast milk)	-
3 <sup>η</sup> -7 <sup>η</sup> ημέρα (3 <sup>rd</sup> -7 <sup>th</sup> day)	0,250	3
2 <sup>η</sup> εβδομάδα (2 <sup>nd</sup> week)	0,700	3
3 <sup>η</sup> εβδομάδα (3 <sup>rd</sup> week)	0,750	3
4 <sup>η</sup> εβδομάδα (4 <sup>th</sup> week)	0,600	3
5 <sup>η</sup> εβδομάδα (5 <sup>th</sup> week)	0,400	2
6 <sup>η</sup> εβδομάδα (6 <sup>th</sup> week)	0,300	1
7 <sup>η</sup> εβδομάδα (7 <sup>th</sup> week)	Απογαλακτισμός (Weaning)	-

- Αναλογία αρνιών: 1 κιλό σκόνη σε 5 λίτρα νερό.
- Αναλογία κατσικιών: 1 κιλό σκόνη σε 7 λίτρα νερό.
- Τα σκεύη που χρησιμοποιούνται να είναι απόλυτα καθαρά.
- Μετά τη 2η εβδομάδα χορηγείται στο ζώο φύραμα απογαλακτισμού BM-382 και σανός άριστης ποιότητας, με ταυτόχρονη χορήγηση καθαρού νερού.

- Ratio for lambs: 1 kg of powder in 5 lt of water.
- Ratio for goats: 1 kg of powder in 7 lt of water.
- The utensils used must be perfectly clean.
- After the 2nd week weaning final feed BM-352 is provided to the animal and hay of high quality, while also granting clean water.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ:** Αναμειγνύουμε τη σκόνη γάλακτος στα 2/3 του νερού που θα χρησιμοποιήσουμε, θερμοκρασίας 50-60<sup>o</sup> C έτσι ώστε προσθέτοντας και το υπόλοιπο 1/3 του νερού, το τελικό ρόφημα να έχει θερμοκρασία περίπου 38-40 °C τη στιγμή της χορήγησης στο ζώο.  
**DRINK PREPARATION:** Mix the milk powder in the 2/3 of the water you are going to use, which should be around 50-60 °C. This way, by adding the remaining 1/3 of the water, the final drink will be around 38-40 °C at the time you will provide it to the animal.

VIOZOIS S.A.

VIOCALF

**ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:** Πλήρες ρόφημα για τον απογαλακτισμό των νεαρών μοσχαριών και πάχυνσης μόσχων. Με συνολική περιεκτικότητα γαλακτικών προϊόντων σε ποσοστό 78% και μια πλούσια σύνθεση σε βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία, αποτελεί την ιδανική επιλογή σκόνης γάλακτος στην κατηγορία αυτή.

**MILK POWDER:** Total drink for weaning of young calves and calves fattening. With 78% total content of milk ingredients and rich in vitamins and trace minerals, it is the ideal choice of powder milk in its category.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (FEEDING TABLE)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΖΩΗΣ (WEEK OF LIFE)	ΡΟΦΗΜΑ (λίτρα) (DRINK (lt))	ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (DAILY DOSAGE)
1 <sup>η</sup> -2 <sup>η</sup> ημέρα (1 <sup>st</sup> -2 <sup>nd</sup> day)	Μητρικό γάλα (Breast milk)	-
3 <sup>η</sup> -7 <sup>η</sup> ημέρα (3 <sup>rd</sup> -7 <sup>th</sup> day)	1,5	3
2 <sup>η</sup> εβδομάδα (2 <sup>nd</sup> week)	2,5	2
3 <sup>η</sup> εβδομάδα (3 <sup>rd</sup> week)	3,0	2
4 <sup>η</sup> εβδομάδα (4 <sup>th</sup> week)	3,0	2
5 <sup>η</sup> εβδομάδα (5 <sup>th</sup> week)	3,0	2
6 <sup>η</sup> εβδομάδα (6 <sup>th</sup> week)	3,0	2
7 <sup>η</sup> εβδομάδα (7 <sup>th</sup> week)	2,5	2
8 <sup>η</sup> εβδομάδα (8 <sup>nd</sup> week)	2,5	2
9 <sup>η</sup> εβδομάδα (9 <sup>rd</sup> week)	2,0	2
10 <sup>η</sup> εβδομάδα (10 <sup>th</sup> week)	1,5	2
11 <sup>η</sup> εβδομάδα (11 <sup>th</sup> week)	1,0	2
12 <sup>η</sup> εβδομάδα (12 <sup>th</sup> week)	1,0	1
13 <sup>η</sup> εβδομάδα (13 <sup>th</sup> week)	Απογαλακτισμός (Weaning)	-

- Για απογαλακτισμό και μοσχάρια παχύνσεως.
- Χορηγείται σε μοσχάρια ηλικίας έως 6 μηνών.
- Αναλογία: 1 κιλό σκόνη σε 8-9 λίτρα νερό.
- Τα σκεύη που χρησιμοποιούνται να είναι απόλυτα καθαρά.
- Μετά τη 2η εβδομάδα χορηγείται στο ζώο φύραμα απογαλακτισμού BM-352 και σανός άριστης ποιότητας, με ταυτόχρονη χορήγηση καθαρού νερού.

- For weaning and calves fattening.
- Given to calves aged up to 6 months.
- Ratio: 1 kg of powder in 8-9 lt of water.
- The utensils used must be perfectly clean.
- After the 2nd week weaning final feed BM-352 is provided to the animal and hay of high quality, while also granting clean water.

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ:** Αναμειγνύουμε τη σκόνη γάλακτος στα 2/3 του νερού που θα χρησιμοποιήσουμε, θερμοκρασίας 50-60<sup>o</sup> C έτσι ώστε προσθέτοντας και το υπόλοιπο 1/3 του νερού, το τελικό ρόφημα να έχει θερμοκρασία περίπου 38-40 °C τη στιγμή της χορήγησης στο ζώο.  
**DRINK PREPARATION:** Mix the milk powder in the 2/3 of the water you are going to use, which should be around 50-60 °C. This way, by adding the remaining 1/3 of the water, the final drink will be around 38-40 °C at the time you will provide it to the animal.

VIOZOIS S.A.

VIOLAMB 60%

Υψηλής θρεπτικής αξίας γάλα για το σωστό και ασφαλή απογαλακτισμό των κουταβιών. Περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα συστατικά για την πλήρη σωματική ανάπτυξη, αποτελεί ιδανική λύση για την ομαλή μετάβαση του κατοικιδίου από το μητρικό γάλα στη στερεά τροφή.

High quality milk for proper and safe weaning of puppies. Containing all the required ingredients for full physical development, is an ideal solution for the pet's smooth transition from breast milk to solid food.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ (FEEDING TABLE FOR PUPPIES)

ΒΑΡΟΣ ΖΩΟΥ (ANIMAL WEIGHT)	1 <sup>η</sup> & 2 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ (1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> DAY)	3 <sup>η</sup> - 7 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ (3 <sup>rd</sup> - 7 <sup>th</sup> DAY)	8 <sup>η</sup> - 14 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ (8 <sup>th</sup> - 14 <sup>th</sup> DAY)	15 <sup>η</sup> - Απογαλακτισμός (15 <sup>th</sup> DAY - Weaning)
	ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (MEALS PER DAY)			
	8	6	5	4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ml ΑΝΑ ΓΕΥΜΑ (MILK QUANTITY IN ml PER MEAL)				
<b>ΠΑΤΣΕΣ ΝΑΝΟΙ ΕΩΣ 5Kg</b> (MIDGET BREEDS UP TO 5Kg)	5-10	15	20-25	30-36
<b>ΠΑΤΣΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 5-15Kg</b> (SMALL BREEDS 5-15Kg)	10-15	20	30-36	50-60
<b>ΠΑΤΣΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 15-25Kg</b> (MEDIUM BREEDS 15-25Kg)	15-20	30	40-50	60-70
<b>ΠΑΤΣΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 25-50Kg</b> (LARGE BREEDS 25-50Kg)	20-25	40	60-70	100-120
<b>ΠΑΤΣΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50Kg</b> (GIANT BREEDS ABOVE 50Kg)	25-30	50	70-80	120-150

Προτεινόμενη ημερήσια χορήγηση  
 Recommended daily feeding

VIOZOIS S.A.

## MILK REPLACERS

VIOLAMB : ΓΑΛΑ ΑΡΝΙΩΝ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ (MILK FOR LAMBS)

VIOCALF : ΓΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ (MILK FOR CALVES)

OXYMILK : ΟΞΙΝΟ ΓΑΛΑ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ (ACID MILK FOR PIGLETS)

VIOMILK : ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ (LIGHT MILK FOR FEEDS)

VIOLAC : ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ (LIGHT MILK FOR FEEDS)

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (ANALYSIS PER KG)

		VIOLAMB 50%	VIOLAMB 60%	VIOCALF	OXYMILK	VIOMILK	VIOLAC
ΟΛ. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (CR. PROTEIN)	%	20	21	24	20	32	30
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ME)	kcal	TME460	TME460	TME460	4.200	3.200	3.200
ΥΓΡΑΣΙΑ (MOISTURE)	%	7	7	7	7	9	9
ΤΕΦΡΑ (ASH)	-/-	9	9	9	6	7	6,5
ΛΙΠΟΣ (FAT)	-/-	17	21	16	20	1,5	1,5
ΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ (FIBRE)	-/-	-	-	1,5	1,5	2	2
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CALCIUM)	-/-	1	0,8	0,7	0,9	0,85	0,95
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (PHOSPHORUS)	-/-	0,65	0,65	0,6	0,6	0,7	0,7
ΜΕΘΙΝΗ+ ΚΥΣΤΙΝΗ (METH+CYST)	-/-	0,6	0,65	0,7	0,4	0,9	0,85
ΛΥΣΙΝΗ (LYSINE)	IU	1,5	1,6	1,5	1,5	2	1,7
ΒΙΤ. Α (VIT. A)	-/-	80.000	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000
ΒΙΤ. D <sub>3</sub> (VIT. D <sub>3</sub> )	-/-	12.000	12.000	12.000	1.500	1.500	1.500
ΒΙΤ. Ε (α-τοκοφερόλη) (VIT. E)	mg	40	40	45	50	50	50
ΒΙΤ. Κ (VIT. K)	-/-	4	4	4	2,5	2,5	2,5
ΒΙΤ. Β <sub>1</sub> (VIT. B <sub>1</sub> )	-/-	4	4	6	9	9	9
ΒΙΤ. Β <sub>2</sub> (VIT. B <sub>2</sub> )	-/-	12	12	12	5	5	5
ΒΙΤ. Β <sub>6</sub> (VIT. B <sub>6</sub> )	-/-	6	6	6	3	3	3
ΒΙΤ. Β <sub>12</sub> (VIT. B <sub>12</sub> )	-/-	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ (PANTOTHENIC)	-/-	30	30	32	18	18	18
ΝΙΑΣΙΝΗ (NIACIN)	-/-	60	60	60	20	20	20
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (FOLIC ACID)	-/-	1	1	1,16	1	1	1
ΒΙΟΤΙΝΗ (BIOTINE)	-/-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
ΒΙΤ. C (VIT. C)	-/-	100	100	100	25	25	25
ΧΟΛΙΝΗ (CHOLINE)	-/-	1.075	920	650	800	800	800

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:** Η σκόνη γάλακτος διαλύεται πρώτα σε λίγο νερό, σε θερμοκρασία 60-70 °C και στη συνέχεια αραιώνεται έτσι ώστε η θερμοκρασία του ροφήματος να είναι η ίδια με του ζώου. Η συνήθης αραιώση είναι 1:5

**GENERAL INSTRUCTIONS:** Firstly dissolve the milk powder in water of temperature 60-70 °C and after it gets diluted in order for the temperature of the drink to be the same with the animal's one. The usual ratio is 1:5

**Συσκευασία: Σάκκοι χάρτινοι των 25 Kg**

Packaging: 25 Kg paper bags

VIOZOIS S.A.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ  
(DIRECTIONS FOR  
FINAL FEED PRODUCTION)

## OXYMILK

Τους καλοκαιρινούς μήνες προτείνεται η εξ' ολοκλήρου χρησιμοποίηση του OXYMILK, ενώ όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες μπορεί να αντικατασταθεί σε ένα μέρος του ή και εξ' ολοκλήρου από VIOMILK

It is suggested during summer months to use entirely OXYMILK, While when the temperatures are lower it can be replaced partially or entirely with VIOMILK.

ΤΡΟΦΕΣ (FEEDS)	ΕΘΙΣΜΟΥ (1-4 ΕΒΔ.) (STARTER 1-4 WEEKS)	ΑΠΟΓ/ΣΜΟΥ (5-10 ΕΒΔ.) (PIGLETS 5-10 WEEKS)	ΧΟΙΡΙΔΙΑ (1-10 ΕΒΔ.) (PIGLETS 1-10 WEEKS)
ΙΣΟΡΡ. ΒΧ-200 (S. C. ΒΧ-200)	50	50	50
ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ (FISH MEAL)	60	50	50
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (MAIZE)	540	660	560
ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ (OXYMILK)	150	75	100
ΣΟΓΙΑ (SOYBEAN MEAL 44%)	200	125	200
ΠΙΤΥΡΑ (WHEAT BEAN)	-	40	40
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)	1.000	1.000	1.000

## VIOMILK

ΤΡΟΦΕΣ (FEEDS)	ΗΛΙΚΙΑ Α' (0-35 ΗΜΕΡΩΝ) AGE A' (0-35 DAYS)		AGE B' (35 DAYS-SLAUG)	
	A	B	A	B
ΙΣΟΡΡ. ΒΚ-200 (S. C. ΒΚ-200)	25	-	25	-
ΙΣΟΡΡ. ΒΚ-201 (S. C. ΒΚ-201)	-	25	-	25
ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ (VIOMILK)	50	50	25	25
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (MAIZE)	565	565	635	635
ΣΟΓΙΑ (SOYBEAN MEAL 44%)	350	350	300	300
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (LIMESTONE)	10	10	15	15
ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ (COCCIDIOSTAT)	-	+	-	+
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)	1.000	1.000	1.000	1.000

www.viozois.gr  
+30 26510 66500

VIOZOIS S.A.

## ΓΑΛΑΤΑ - MILK REPLACERS

## VIOLAMB

## VIOCALF

## OXYMILK

## VIOMILK

## VIOLAC

**ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑΣ**  
4,7 χλμ. Γαλάζιας Ακτής - Καλυβίων  
Καλύβια Αττικής  
Τηλ: 22990 - 46034  
Fax: 22990 - 46035

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
7<sup>ο</sup> χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών  
Τηλ: 26510 - 91605 / 91140  
Fax: 26510 - 92533

**ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**  
2<sup>ο</sup> χλμ. Συμμαχικής Οδού - Ιωνία  
(προς Ωραιόκαστρο)  
Τηλ: 2310 - 784702  
Fax: 2310 - 784041

**ATHENS OFFICE - WAREHOUSE**  
4,7<sup>th</sup> km Galazias Aktis  
Kalyvia - Attica  
Tel: +30 22990 46034  
Fax: +30 22990 46035

**IOANNINA HEADQUARTERS -  
PRODUCTION**  
7<sup>th</sup> km Ioannina - Athens  
Tel: +30 26510 91605 / 91140  
Fax: +30 26510 92533

**THESSALONIKI OFFICE - WAREHOUSE**  
2<sup>nd</sup> km Symahikis Odou - Ionia  
(to Oreokastro)  
Tel: +30 2310 784702  
Fax: +30 2310 784041

www.viozois.gr